

11

Aconitum lycoctonum I. Sbsp. vulparia /Rehb./

Formánek, II. 2, 1897, p. 1448.

1756, *A. vulparia* Rehb. (O. žlutý, psi mor, vlčí mor.) Lodyha
přímá a jako ostatní části ± pyříta, jednoduchá neb slabě větvenatá.
Listy řapíkaté, dolejší srdčité okrouhlé, 5-7klané, s laloky klinovité
kosníkovými, 1-2krát 3klanými a ústy podlouhlými neb široce kopi-
natými, stříhané zubatými. Květy v dosti hustých, přímých, listena-
tých, jednoduchých neb nejdoleji trochu větvenatých hroznech. Stopky
květní s 2 listenci. Přílba kalichu u válcovitě kuželovitá,
3krát delší než širší, síkmo vzhůru směřující. Nehet plátků
kapovitých rovný, pírný, nahore s ostruhou tenkou, hle-
m řždovitě stočenou. Měchyčky 10-15 mm. dl., namnoze 3,
obvykle mrtnaté, fidčeji lysé. Semena 3hranná, 3 mm. dl. na všech
3 stranách s ostrými, klihatými, příčnými vráskami.

V. 0:40-1:20 m. Květy širožluté, nahnědle žilnaté. +. *A. ly-*
coctonum L. part. Odrůdy α) *phthora* Reichb. Přílba 15 mm.
dl.; měchyčky lysé; lodyha a stopky květní chlupaté β) *interme-*
dium Host non DC. = *cetium* Beck. jako α), leč měchyčky chl-
paté γ) *typicum* Beck Fl. N. O. p. 402. Přílba 20-25 mm. dl.;
lodyha a stopky květní husté, obal květní bohatě chlupatý; měchyčky
lysé δ) *galocotum* Reichb. = *A. Jacquinianum* Host mě-
chyčky chlupaté, ostatně jako γ. ε) *pauciflorum* Host sp. Přílba
17-22 mm. dl., lodyha a stopky květní lysé, listky obalu květního jen
po kraji brvitě neb zcela lysé.

4 Července, srpen. Kamenité a keřnaté stráně, lesy, horní zleby, mytíoy;
v odrůdách α, β, a δ. porůznu. V brněnském kraji: Pisárky u Brna, Josefské
údolí u Adamova, Sloupské údolí, u Tisnova a Nikotič (Makowsky), u Kunštátu
a Olešnice (Čupek), Burgšládké vrchy u M. Trebové (Domas), o čemž Czerny
pochybuje; u Abtsdorfu (Niessner), u Nebovid (Wiesner), Polavské kopce
(Schlosser), Ōchoz, Obecný les a Melatinské údolí u Bilovic, Bystre, Jundrov,
Kohoutovice, Sítelice. — Ve Znojemsku: u Čikovské myslivny blíž Náměště
(Roemer), v údolí Dyje od hradu Rakous dolů porůznu, jako v údolí Ledovém

(Niess), u Hardeku a v údolí Jizery mezi Lukovem a Čížovem (Oborny). V Ji-
hlavsku: mezi Panským a Koskovým mlýnem při pravém břehu Jihlavy u Ji-
hlavy (Pokorný), v okolí Třebíče jen na jednom místě v lese nad Čichoven
u Ptáčova (Zavřel), Černý les u Zámku Žďaru (Kovář a Havelka). V Olomoucku
a v Jeseníku: u Roudna a Berouna (Rieger a Gans), v údolí horní Moravy,
jako u Hamšovic a Holby, v údolí Brané u Koldstýna a Josefova, v údolí
horní Tisé u Wiesenberka, u Teplé a jinde ve zlebech a údolích Jeseníka ne-
zřídka, jako u Frant. myslivny a u Vrbna (Oborny), ve Velk. kotlině, na Stu-
dénkové holi a Keřlichu (Grabowski), na Leiterberku (W. Gr.) až k Vidlič
(Bachmann), v Mal. kotlině (Engler), v Křemenném příkopu (Uechtritz), Ulrich
u Mal. Moravy (Scholz), v šterbinách skalních u Karlsthalu (Reissek), a v šterku
Opavy (Wetschky), v údolí horní Tisé u Winkelsdorfu. — Ve východní části:
hojně v secích hřebenem Javořiny (Holuby), u Vsetína (Bubela), zde hojně na
Ostré hoře; Les Polténá u Val. Mezirříčí (Klanic), v Bernatském lese u Odry blíž
St. Jiřina (Ig. Pouč), na Petřkovské hůře*) u Petřkovic a na Javorníku u Vě-
tovice (Sapetza), u Hranic (Vogl), keřnaté stráně v údolí Bečvy u Teplé (Ripper),
u Halenkova, v pohorí Javorníkův, na Velké a les Studenčany u Star. Hamer,
Peretloňky, Klín, Polana a Smrk poblíž Ostravice. — Ve Slezsku: v travnaté
zahradě u Bystrzice (Kolbenheyer), zde bezpochyby zdivočelý; u Kunova, Holčie
u Vigšteinu u Opavy (R. a M.), 7) fidčeji, jako v údolí horní Tisé 8) na Leiter-
berku a ve Velk. kotlině.

*) Dle hodnověrných zpráv z Nov. Jiřina mi podaných, sluje vrch tento „Petř-
kovská hůra“ dle osady Petřkovic; nikoliv však „Pečavská gora“, jak ve spisech a na
mapách shledáváme.

40413