

Knollen kugelig, Stengel bis 60 cm hoch, reichblättrig. Untere Blätter lineal länglich, obere scheidenförmig, fein zugespitzt. Ähre pyramidenförmig oder eiförmig, dicht. Perigone carminroth, selten weiß (*albiflora*). Lippe 5 bis 7 mm lang, die Zipfel meist ganzrandig. Sporn so lang oder länger als der Fruchtknoten. Äußere Perigonblätter meist zugespitzt.

**1. Anacamptis pyramidalis.**

L. C. Rich. de Orch. Eur. Annot. 33; Neill. Fl. NÖ. 192. — *Orchis pyramidalis* L. Spec. pl. 940 a. — *Aceras pyramidalis* Reichenb. fl. Ic. Fl. Germ. XIII 6 t. 9.

Vorkommen: In Wiesen und an buschigen Stellen der Bergregion bis in die Krummholzregion, namentlich in den Kalkvoralpen, sehr zerstreut. VI, VII.

RCHB. Fl. Germ. exc. 122 /1830/

CXXXII. *Anacamptis*. Rich. *Anacamptis*. Col. loricatus. Cor. patens, lobum ad faucem bilobuligerum, longe coloratum. Filamentum stipitibus connatis, pollen lobuloseum. — Tubera rotundata. —

827. *A. pyramidalis* Rich. lora subrotunda peristoma e punctis punctatis tripartito basi tuberculato: laciniis aequalibus integerrimis, calcaris curvum excedens, spica densa oblonga. Hall. in. ltbl. v. XXXVII. *Orchis pyramidalis* L. Engl. Bot. 110. Jacq. n. t. 208. Rich. pl. erit. VI. 760. Sw. Bot. 384. Herb. Lond. 106. cum var. alba. Pedalis, gracilis, filis oblongo-lanceolatis, superiora brevioribus, spica densa pyramidalis, flo-

Anacamptis

16632

*Anacamptis pyr.* Alpy: ex Walther ab 1700; v. D. i. H. Rekonisch u. b. g. v. do Ric. pot me, J. Murr DBM. XXV. 132 (17)