

Setouplí-me-li na jižním úpatí záp. Doutnáče (Holé Pláně, nad 350 m),

p. 31 spatříme mezi háji rozsáhlé druhotně polostepní louky, kde právě rozkvétá nádherný rudohlávek (*Anacamptis pyramidalis*). Roste tu jen jednotlivě, hlavně při okraji křovinatých hájů a objevuje se pak znovu značně dále k východu, jednak na polostepních lukách, jednak v světlých hájích, ale i tam, kde je ho poměrně nejvíce, je jen volná skupina 8—9 kvetoucích rostlin, nic více. Zastihli jsme jej však přece celkem na třech, navzájem dosti vzdálených místech.

Tyto polostepní lučiny s rudohlávkem nejsou sociologicky vůbec ustáleny a nehodí se pro snímek pro svůj druhotný ráz a z něho vyplývající kolísavou strukturu. Na jednom místě, kde kvetl *Anacamptis*, rostla na př. *Stachys recta* v. h.!, *Coronilla varia* h.!, s nimi *Achillea pannonica* (r.), *Arrhenatherum clatius* (r. až dosti h. r.), *Carex humilis* (r.), *Centaurea rhenana* (h. r.), *Dianthus carthusianorum* (r. až dosti h. r.), *Festuca vallesiacu* (dosti h.), *Helianthemum* <sup>o</sup> *ovatum* (r.), *Hieracium echinoides* (r.), *Koeleria gracilis* (r.), *Potentilla arenaria* (místy dosti h.), *Salvia pratensis* (r.), *Scabiosa ochroleuca* (r.), *Teucrium chamaedrys* (r. kol.), *Trifolium arvense* (r.), *Veronica* <sup>o</sup> *lychnitis* (r.), *Vicia hirsuta* (h.).

16643

Domin, Rozp. Tr. L. O. Střed. Lit. č. 14 p. 31-34

(1942)

(p. 31) Jinde roste zase na těchto lučinách s rudohlávkem také *Azotis vernalis* (v. h.!), *Aster linosyris* (v. posp.), *Inula hirta* (posp.), *Lathyrus pannonicus proles versicolor* (hlavně při okraji křovin a hájů), *Medicago minima* (r.), *Melampyrum cristatum* (h.), *Muscari tenuiflorum* (místy posp.), *Pulsatilla nigricans* (dosti h. r.), *Ranunculus polyanthemus* (lok.), *Rosa gallica* (lok.), *Seseli hippomarathrum* atd.

Zastihl jsem však *Anacamptis* i pod širokým dřínem (*Cornus mas*) na volné půdě s v. h. *Primula veris* subsp. *inflata* a jednotlivě i ve světlém háji (v smíšeném *Quercetum sessilis*).

p. 32 *Anacamptis pyramidalis* je v Čechách vzácnou přírodní památkou a zaslouhuje si nejprísnější ochrany. Mimo popsanou lokalitu (roste tu nehojně i výše na svahu, kde jej sbíral ing. O. Dlouhý) znám ještě dvě další na Velké hoře. Jedna z nich je v západní části (zhruba nad skalkami s *Dracocephalum*, druhá východněji při průseku, probíhajícím směrem západovýchodním k lesům u Ameriky. Tu nalezl jsem rudohlávek dne 20. června 1925 ve květu v dosti značném počtu exemplářů.