

Subtribus c. Lapsanaeae.

Cass. in Diet. sc. nat. XXVIII (1827) 422; Koch Syn. 415; Bischoff Beitr. 6; Neir. Fl. NÖ. 399.

Kelch fehlend. Früchte oben abgestutzt oder mit einem mehr minder deutlichen Ringe versehen. Kronröhre unserer Arten behaart. Sonst wie Subtrib. b. — Gatt. 661—663.

661. Arnoseris (Lämmersalat).

Gärtn. de fruct. II 355 t. 157; DC. Prodr. VII 79; Bischoff Beitr. 12; Neir. Fl. NÖ. 399; Benth. Hook. Gen. II 507.

Hülle glockig. Hüllschuppen ein- oder zweireihig, die äußeren viel kürzer, die inneren bei der Frucht reife fast kugelig zusammenschließend. Blütenboden ohne Spreublätter, flach, etwas wabig. Zungenblumen an der Spitze fünfzählig, gelb. Antheren am Grunde pfeilförmig. Früchte drei- bis fünfkantig und gerieft, am Grunde verschmälert, am Scheitel gestutzt, oben mit oft in kleine Zähne auslaufenden Kanten. Kelch fehlend.

Wurzel spindelig, einjährig. Blätter grundständig, aus keiligem Grunde verkehrt eilänglich, gezähnt, rau behaart. Stengel mehrere, blattlos, unten roth, einköpfig oder in wenige einköpfige Äste getheilt, bis 25 cm hoch, unter den Köpfchen keulig verdickt und hohl. Köpfchen 1 cm lang. Hüllschuppen zugespitzt, flaumig. Blumen gelb. Früchte 1.5 mm lang.

1. Arnoseris pusilla.

Gärtn. de fruct. II 355; DC. Prodr. VII 79; Bischoff Beitr. 12; Neir. Fl. NÖ. 400. — *Hyoseris minima* L. Spec. pl. 809. — *Lapsana minima* All. Fl. Pedem. I 206; Lam. Diet. III 414. — *Lapsana pusilla* Willd. Spec. pl. III 1623. — *Arnoseris minima* Link. Enum. hort. Berol. II 294.

1267 Vorkommen: Auf sandigen, erdigen Stellen, in Feldern, Brachen häufig im Granitplateau des Waldviertels, südlich bis nach Melk und Langenlois; gegen Böhmen zu gemein. VI—VIII.

62562

RCHB. Fl. Germ. exc. 250 /1831/

CCXXIV. *ARNOSERIS*. Gärtn. Lämmersalat. *Anthod. a squamis aequalibus, fructiferum connatis torulosum. Rec. sudan. Achen.*
prismatico pappe stellari angulato.
 1033. *A. pusilla* Gert. t. 157. *lata, caulis subnulla, caulis tener spinulosus divinus pedunculis inflati.*
Laps. pusilla Willd. Hook. Lond. t. 65. *Hyoseris minima* Link. Schk. t. 236. Engl. Bot. 96. Fl. D. 201. *— Auf Aethiopia unter Swat. — Men. Jun. 0.*
Folia radicalia obovato-oblonga den-

Arnose-
ris

0.27

JAROSLAV MIKULÁŠ

Mělník

Mělník

Arnoseris pusilla Gärtn.

62565

1) Gorka, přehránká pole 140 m.
(voda d. Páchna)

1888

Jan. Mikuláš

Arnoseris pusilla f. *major* m. okr. Plzeň: v porostu paličkovice šedé na Sulkově, F. Maloch Rostl. út. v. Plz. okr. 67 (1939)