

Rohlena, ČNM XCVIII/1924/, p. 70  
*Artemisia*

*A. scoparia* W. K. — Pod kostelem v Přibyslavi (Baudl.).  
Baudyš

Rohlena, ČNM XCIX/1925/, p. 99

*A. scoparia* W. K. — V Pisku u jatek a na protější skále na pazderně (Rh.).

Čelak. Prodr. II. /1873/, p. 232-233.

6. *A. scoparia* W. Kit. P. metlatý. Kořen větvenovitý, větvenatý, 1—2letý. Lodyha jednotlivá, ztuha přímá, nahoře latnaté mnohovětvená. Listy dolejší 2—3krát, hořejší jednoduše peřenoklané, s ústý úzce čárkovitými, hrotnatými. Úbory kulato-vejčité, podporující je listy částečně ouškaté, nejhorejší nedělené.

Výš. 1—2'. Listy spodní v rozetce, v čas květení nejvíce uschlé. Podobný předěsítmu, lata útlejší, úbory ještě menší. Květy červenavé.

☉ a ☉ Srpen, září. Na písčných kopcích, průhonech, zdech, skalách, řídký, velmi roztroušený, nevšude asi původně domácí. U Prahy: Líbeň (Kostelevský), Folimanka (Opie)! — Na zdech u Ml. Boleslavi (Aschers.), na pískovcových skalách v městě

Mn. Hradišti! Labský ostrov u Litoměřic, velmi porůznu, též u Černivské bažantnice (A. Mayer!) Karl. Vary a Loket (Ortmann, Aschers.), Benešov, Vlašim (Presl). Skály u Tábora (Sieber v herb. Sternberkové).

p. 233.

Čelak. Prodr. IV. /1883/, p. 790.

*A. scoparia* W. Kit. Velikost úborů se mění mezi 1½—2 mm. Neří-li celá bylina i s kořenem před očima, bývá někdy ztěžší od *A. campestris* microcephala k rozeznání; pročež se klomim k náhledu, že jest *A. scoparia* spíše jen plemeno předěslé.

U Ledče na Sázavě (Dědeček)?! [mladý zakrsalý pochybný exempl.]. V Jindř. Hradci u zdi zámecké blíž zámeckého příkopu, ve více exempl.! [Lodyha tu hned od zpodu se větví, v paždi spodních listů má výhonky listnaté.]. Na zdi u silnice před branou Bechyně dosti čtne! Skály Otavské a suché vršky u Strakonice, rozšířena (Velen.)! Praha: hráz pobřežní u papírny ve Vraném, hojně s *A. campestris*, porůznu též u břehu Vltavy mezi Vraným a Skochovicemi a u Záběhlí (Hansgír!) — Bezděz (Lorins.)! Na Kunětické hoře u Pardubic, na východní straně za hradem v hojnosti, s *A. campestris* (Hansg.)! Uvádá se ještě: u Něm. Brodu na skalnaté stráni za brusfrou (Novák); na ostrovech Labských u Litoměřic porůznu a na kraji Černivské bažantnice (Mayer); u Chvatěrub na břehu Vltavském (Leonh.); — ač nebyla-li tu a tam mívána var. β. předěslé.

Domin, VKČSN, 1904. XVIII, p. 42.

*Artemisia scoparia* W. K. Im Tale des Beraunflusses bei Skreje.

Domin, VKČSN, 1905. XIX, p. 36.

*Artemisia scoparia* W. K. Im südlichen Moldautale bei Kamejk.  
— Nordostböhmen: Zebín bei Jičín, zahlreich (A. BAYEN).

Čel. Anal. Kv. 3vyd. p. 192, 1897.

\**A. scoparia* W. K. Kořen větvenovitý, větvenatý, 1—2letý. Lodyha jednotlivá, přímá, nahoře latnatá, někdy též od zpodu větvitá, její nej-dolejší listy v rozetce, ale za květu namože již zahynulé. Úborky velmi malé, kulato-vejčité. K předěsítmu, zvlášť jeho maloborné od-růdě β. velice podobný. ☉ neb ☉ 1—2'. (P. metlatý.) S. 9. Písčinné kopce, průhony, u zdi a cest, pořádku. Č. P. Lz. Šj. Rk. Čzj. M. zvláště jinější.

62787