BR Bromus secalinus L. ssp. vulgaris /Koch/Dom.
Frýdlantsko:vzácný. Kunratice na Z straně koty 381. Víska, uhor při silnici u býv.rest.; Nové Město pod Smrkem 1 trs při dráze na Jindřichovice pod Smrkem u přejezdu poblíž nádraží.
Jehlík 1958 Sbor. sev.mus. Liberec 1 /1958/:102

HR

Bromus secalinus L. ssp. vulgaris (Koch) Dom. – Před lety v žitě blíže Kláštera na Novobystřicku; Radouňka: u ryb. Rocho (Tejčka 1904); K. Radouň: v obilí porůznu (před 40-50 lety vel. hojný, Klenka). V Z č. okr. jsem jej nikde nenašel, ačkoliv starší lidé tvrdí, že prý dříve býval v obilí jako plevel častý (viz též Natur und Heimat, 6: 22, 1935). – Dr. J. Houfek: „Studie o květeně Jindřichohradecku se zřetelem…" Disertace: Bil KU Praha 1952: 349.

361

HR

Bromus secalinus L. – poměrně málo zastoupen, více na jižní a jv. straně hor. Z literatury je znám Eichberg u Radonic, nedaleko Kadaně (Čelakovský ml.); pod Dubovým vrchem (asi ve výšce kolem 350 m u Podbořan, na poln., písč. mezích. Zjistila jsem něk. pětkrát vyjm. trsů při silnici K. Vary – Bochov, podél pol. cesty u Dol. Valova a Tisu, na zemních v Bošově a u Vrbice (Řeháková); též mezi Klášterecem a Šumnou – Dr. J. Řeháková: „Fytogeograf. nástin kv. Doupov. hor." Disertace: BlíKU Praha 1952: 217

Bromus secalinus L.
BR Nymburske: pořídku v háji u jizbické hájovny, u hájovny Loučenky
Kaufman 1947 Květena nymburského okresu 85

Bromus secallinus – vých.Frýdku. Kühn Frant., PSOK XVI-1955, 10.

K Bromus secalinus – Poldesí vých. potoka (Frýdek). Kühn Frant., PSOK XVI-1955, 2, sním.

Bromus secalinus – vých.Frýdku. Kühn Frant., PSOK XVI-1955, 37. K

K Bromus secalinus – záp.Pazderny (Frýdek). Kühn Frant., PSOK XVI-1955, 13, sním

---

Zdroj: Rozpisy floristické literatury po roce 1945
Taxon: Bromus secalinus