

Aconit. vulparia (v. vulgare) Litomyšlsko: Vys. Les, okraj dolního lesa, Fr. Kopec-
ky Od Trstěn. Stážky XIV. 139 (1935)

Aconit. vulg.

op. stráně od Litomyšle k Vys. Mýtu, Boh. Fleischer, ex Dom.
Spisy Přír. Fak. K. Univ. 1924 č. 9 p. 33

Dom. Věstn. Kr. Č. Sp.
N. Tr. II. Č. I.
p. 7-8 (1942)

Aconitum lycoctonum L. subsp. vulparia (Rehb.) Schinz. et Keller.
U Ústí jsem je neviděl, je však roztroušeno jako charakteristický druh
opukový a zbytek smíšených bučin v okolí Litomyšle a Sloupnice (ČELA-
KOVSKÝ, B. FLEISCHER, TH. NOVÁK, ZOERNIG), u Poličky (HANSBURG),
v okolí České Třebové (lesy v Zádolkách, NESPOR a HORČICKÁ 1905 p. 81;
kamenitý břeh potoka za Rybníkem, F. MALOCH 22. VII. 1892!). EN, p. 8
ERXLEBEN (1837, p. XXVIII) je uvádí u Lanškrouna, NESPOR a HORČICKÁ
(l. c. 160) také u Zámberka. Podle těchto autorů (p. 166) roste A. napellus
už v okolí Rokytnice a A. Stoerckianum Rehb. u Zámberka. Tento
hybridogenní druh tu není původní; viděl jsem jej — právě jako B. FLEI-
SCHER — jen pěstovaný v zahrádkách.

Aconitum vulparia Itálie: okolí u Kranenbuchs, op.; na četných místech,
palest. pool. Hlasy (Domin. U. R. IV. 252 [53])

Aconitum vulparia Rehb. V Štírově dolu u Kru-
cemburka. Dom. Pl. Kl. Přírod. v Praze 1923-24 p. 18 (24)

Aconitum lycoctonum subsp. vulparia (mapa 41) roste na rulovém podkladě
p. 264 (!) ve zříceninách Hirsštejna v pásmu haltravském — ve stinné balvanité
p. 265 pomíšené bučině na sv. — sev. — sz. svahu jeho temene, L. KRESL Kv. Domažlicka
264-265 (38)

Aconit. vulgar. stráně — úd. řáb. stý, A. Kobale Flor. Hroz. Humpol. 1 (38)

Aconitum vulparia — Želivka, našel již Bezděk, P. Letáček Kv. Humpol. 45 (1943)