

## 2. Gruppe. Lychnideae.

A. Braun in Flora (1843) I 365. — Wicht. Arb.: P. Rohrbach Synopsis der Lychniden in Linnaea XXXVI (1869—1870) 170.

Kelch mit Commissuralnerven versehen. Blumenblätter in der Knospenlage wechselseitig, d. h. abwechselnd gedreht, bisweilen dachig.

209. *Agrostemma* (Kornrade).

L. Gen. 135 nr. 379, ed. VI, 231 nr. 579; Neilr. Fl. NÖ. 818; Pax in Engl. Prantl Nat. Pflanzenfam. III 1b, 70. — *Githago* Desf. Cat. hort. Par. 266. — *Lychnis* sect. *Githago* Benth. Hook. Gen. I 148.

Kelch länglich, oben verengert, mit 10 hervorragenden Rippen und linealen, blattartigen Zipfeln. Blumenblätter im unteren Theile des Nagels mit 2 Flügelleisten, ohne Krönchen. Griffel 5 (selten 4). Kapsel einfächerig durch Randtheilung der Fruchtblätter mit 5 (selten 4) kurzen Zähnen aufspringend. Same mit breitem Rücken, fast tetraedisch.

Die ganze Pflanze sammt den anfangs 3, später bis 5 cm langen Kelchen fast angedrückt seidenhaarig. Spreite der Blumenblätter verkehrt eiförmig, fast abgestutzt oder ausgeschweif, trüb purpurlila. Kapsel länger als die Kelchröhre. Same schwarz, reihenwarzig stachelig, 3—3.5 mm hoch und breit. Stengel bis 1 m hoch. Blätter lineal lanzettlich. Blüten einzeln, lang gestielt. Einjährig.

1. *Agrostemma githago*.

L. Spec. pl. 435; Neilr. Fl. NÖ. 818. — *A. hirsuta* Gilib. Fl. Lith. V 173. — *Lychnis Githago* Scop. Fl. Carn. ed. 2, I 310. — *Githago segetum* Desf. Table de l'école bot. (1804) 159 (nach Neilr.).

Vorkommen: In Feldern und Brachen häufig bis in die Voralpen. VI—IX. — „Spitzbua.“

22980

RCHB. Fl. Germ. exc. 826/1832/.

CMXLI. *Agrostemma* a. L. *Rudic. Col. coriaceus* s. Ehrh. *Cor. pet. 5, indivisa retusa. Stam. 10. Stylis 5. Caps. unilocularis 5-dentato-dibiscus.*

a. *Githago* Desf. *corona nullis*:

512. *A. Githago* L. *hirsuta, calycis corollam superantem, petalis submarginatis. Fl. D. 476. Dicoel. ed. Hayne s. 22. Schk. 1, 121. Sturm in L. v. Sv. Hist. nat. Arvensis Githago Scop. Bi-tripetalis, gracilis, rami arrecti - petalis elongatis longe terminali solitario, calyx longissime acuminatus petalis lacrimosa e basi trisetata parum*

excedens, semina subtriangula granuloso-muricata atri, embryo his infracapitulis — *St. microrrhizis* DC. calycis lacinis petalorum laminae hirsutis duplitem longis calicibus constantibus, sed minime cultis et raris. — *Agf. Tetradactylum* — *β. in der Gegend von Vitzka: v. Chertop. — Jun. Jull. ☉*