

16647

1. Znojensko.
2. Pavlovské kopce.
3. Podyjí od Znojma k ústí Dyje.
4. Jv. xeroth. okraj Čsmor. vys.: Miroslav.
5. Mohelno
6. Moravský Krumlov.
7. Brno (j. úpalí Dražanské planiny).
8. Pouzdřany.
9. Čejč.
- \*) 10. Jihomor. písčiny (Hodonín - Bzenec).
11. Větrníky.
12. Prostějov.
13. Olomouc.
14. Kříby u Seničky sz. od Olomouce.
15. Sv. Josef nad Slavěnicemi sz. od Litovle.
16. Vitošov jv. od Zábřehu.
17. Stepní území Bíl. Karpat mezi Moravou a Olšavou.
18. Holešov (mezi Rusavou a Dřevnicí).
19. Pobečví.
20. Poodří.

Poznámka: Kloboučky u Pučovic.

Anacamptis pyramidalis Rich.

Formánek, I. 1. 1887, p. 228

M.

130. Anacamptis Rich. Rudohrávek.

421. A. pyramidalis Rich. (Orchis pyram. L. R. jehlanitý).  
 Klas hustý, mnohokvětý, z mládí krátce jehlanovitý, posléz vejčité pod-  
 dlouhý. Pysk do polu tříklaný, s ušty podlouhlými, celokrajnými, na  
 spodině s 2 podlouhlými šupinkami. Ostruha nitkovitá sehnutá, zdělí  
 semenníku. Listy úzce neb čárkovitě kopinaté, dolejší sblížené, hořejší  
 oddálené malé. Hlízky skoro kulovité.

V. 0.30—0.50 m. Okvěti malé, pěkně karminově červené, řídceji  
 světle nachové neb bílé. Květy vonné.

4 Červen, červenec. Horní lesní, jmenovitě vápenitá luka. Pořídka.  
 Zřídka po hřebeni Javořiny; na horských lukách „Nová hora“ blízko morav.

Kopar-14

hranice u Březové pod Lopeníkem (Holuby in lit.), luka lesní „nade Mžíky“  
 u Vsetína 1884 hojný (Bubela), u Rožnova (Schlosser). Ve Slezsku jen v Tě-  
 šínsku: hojný na Tulu u Horn. Lišné (Grabowski a Kotschy), blízce Ustroně  
 (Milde), ojedinelý na levém břehu Gluchové u Bystrzyce (Ascherson).

p. 229

16648