

Anacamptis pyramidalis - Mor.Karp.: rozšířen od Radějova po Březovou. Radějov: Kutky v Mandátském údolí, Blatnička: Horní, Suchov: pod Hájem, Lhotky: za Jamným, Velká: Zahrady /Bílý/, Lěšč, Březová: pod Lopeníkem hojný, pod Dubravou u zemské hranice, - St.STANĚK Sb.Kl.Př.Brno 25,VIII.105 /26/.

**Podp.Sb.Kl.Př.Brno 1931, XIV, 200 /32/.**  
**696. ANACAMPTIS PYRAMIDALIS**

Rich. Mem. Mus. Par. IV. 41, 1818.

MORAVIA ORIENT., Carpathi Albí: Strážnice; in pratis submontanis prope  
Javorník, ca 500 m s. m.

21. VI. 1931.

leg. J. PODPĚRA et SOCIL.

Podp. Čas.  
Mor. Mus.  
Zemak, XIV.  
426/14/

Anacamptis pyramidalis Rich. Kloboučky u Bučovic. (Wildt, 1896)!. — Vsetín: na jednom místě na horní lučině „nade Mžky“ za hutí (Bubela 1884)! — Strážnice: Velká (Beňa)!, Vojsice (Dr. Votruba), Čertoryje v Radějovském údolí, mez Novou Lhotou a Javorníkem; miluje kefnaté, k severu skloněné stráně (Čouka).

med. horský  
Podp. Sb. Př.  
Sp. M. Ostr.  
I. 40 /21/

○ *Anacamptis pyramidalis* Rich. Rudohrávek nám představuje geograficky a geneticky týž element, jako předešlý vstavač bledý. Jest však více rozšířen v pásmu středomořském, kde roste ve vyšších polohách od Španělska po Kavkaz a Orient. Na Moravě počíná u Strážnice, kde areál jest pokračováním rozšíření v Malých Karpatech mezi Váhem a Moravou na Slovensku, roste pak vysocce roztroušeně po všem lřebenu karpatském (Vsetín, Rajnochovice, Rožnov) a dosahuje místní severní hranice v Těšínsku, kde jest hojný na Tulu u Horní Lišné a blíže Ústroně. Zajímavým zjevem jest rozpojitý výskyt v Zdánském lese, kde r. 1896 objeven ing. A. Wildtem u Klobouček nedaleko Bučovic.

*Anacamptis pyramidalis* Rich. [4 sp., 18 sp.]

Pouze za východní hranicí území u Rajnochovic (GOGELA).  
Zem. rozš.: Areál meridionální. *Podp. Krb. Kana, 86, (17).*

*Anacamptis pyramidalis*. Sv. M.: Ojediněle u Rajnochovic, mezi Vsetínem a Rožnovem (Rouštka), F. Gogela Věstn. Kl. Př. Prost. 1903, VI. 93 (1904).

*Anacamptis pyramidalis*, Morava: u Haluzic, V.VOTRUBA 1942 in litt.

*Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich. — Rozšířen od Radějova po Březovou. Radějov: Kutky v Mandátském údolí, Blatnička: Horní, Suchov: pod Hájem, Lhotky: za Jamným, Velká: Zahrady (Bílý), Lěšč, Březová: pod Lopeníkem hojný, pod Dubravou u zemské hranice.

Staněk. Sb. Kl. Př. Brno VIII. 105(25).

*Anacamptis pyram.* Hostýnské horstvo: ojediněle na Polomsku, FR. GOGELA Zálhotský sborník II.7 (1928)

*Anacamptis pyramidalis* Richard.-Wimm. Fl. Schles. 328/1832/, 2. Bearb. 361/1840/, 3. Bearb. 148/1857/  
3.: Ustron u Těšína. Ob.-Lischna) am Tul.  
*4. Bělá*

*Anacamptis pyramidalis*. M.: „Machovy“ louky u Velké. Spore, F. Čouka Věstn. Kl. Př. Prost. 1906, IX. 86 (1907).

*Anacamptis py.* M.: Klenov u Vsetína, karp. vrch. louky, R. Ficbauer Věstn. Kl. Př. Prost. 1910, XIII. 59 /10/