Anacamptis M.: dosud byl známa na M. jen pochybná lokalita Schlosserova „u Rožnova". R. 1884 jsem jej nalezl na lesní louce „nade Mžíky" u Vsetína v četných ex., J. Bubela ÖBZ. XXXVI. 365 (86)

Anacamptis pyr. M.: objevil Steidler na horských lukách u Bučovic, A. Makowsky Verh. Nat. Ver. Brünn XXXV. 1896 Sitzb. 42 (97)

Anacamptis pyr. na louce nade Mžíky v horském hřebenu mezi Vsetínem a ~~Ústím~~ Johanovou, G. Říčan V. P. VII. 297 (26) (695

Anacamptis pyr. Mor. Karp. u Vsetína: v mokřině a na vlhkém svahu nad ní pod studánkou, z níž pramení potůček Bradný (Jul. Macháček) a na druhé lokalitě dále na lukách těch na SZ, G. Říčan Sb. Kl. Př. Brno 1927, X. 45 (28)

Anacampt. pyramid., E. Fiek Fl. v. Schles. 432 (81): Těšínsko (Tul)

Anacamptis pyram. Karlšt.: skup. Doutnáče: Holé Pláně, jednotlivě na druhotných (polostepních) bučinách, hlavně při okraji křovinatých hájů. Na tomto j. teplém úpatí (nejdolejší zoně svahové) skupiny Doutnáče roste na několika místech, jednak na polostepních lukách, sociologicky neustálených, jednak v světlých hájích. Ovšem i tam, kde je ho nejvíce, je volná p. skupina 8-9 kvetoucích rostlin (počíná právě kvésti), nic více. Než zastihli jsme jej přece na 3, od sebe dosti vzdálených místech (výše c. 300-310) (27. VI. 39). Lok. i pod širok. dřímem na volné půdě s h. Prim. veris canescens! Jednotlivě i ve světlém háji (sníž. Querc.-sess.)

Anac. pyr., Wim. Fl. Schles. 2. Aufl. 361 (1840): tučné louky v předhoří. U Ustroně u Těšína na loukách u H. Lišné a na Tulu (Kotschy)