

Anacamptis pyramidalis - M., Strážnice: "Čertoryje" v Radějovském údolí.
Velká: louky mezi Novou Lhotou a Javorníkem. Miluje keřnaté, k severu
skloněné stráně, - F. ČOKA Věstn. Kl. P. Prost. 1908, XI. - 149 /09/.

Anacamptis pyramidalis RICH. *Chyby*
V celém území nalezl jsem tuto rostlinu
jen na Moravských lukách nad Kory-
čany. Tyto louky jsou na podkladu vá-
pencovém neb na horninách mající zna-
čné % CaCO₃. Jsou to polopůvodní loučky,
podobného charakteru, jaké popisuje
SILLINGER P. ve studii o Bílých Karpa-
tech. Chybí zde ale některé prvky, které
jsou charakteristické pro louky v soused-
ním území karpatském.

Dr. M. K. V. 1909. 10. 19. 1912
Dr. M. K. V. 1909. 10. 19. 1912

Anacamptis horské louky u Ustroně u Těšína, Milde Bot. Zeit. X. 716
/1852/

Anacamptis pyramid. (natura, kde jej po prvé nalezl H. Kotschy) Slezsko, K. Kolben-
heyer Verh. Z.-B. Ges. Wien XII. Abh. 1198/82

Anacampt. pyram. (dr. Rothé nalezl u Kloboučků) M.: okr. Kyjov, A. Wildt Verh. Nat.
Ver. Brünn XL. 1901 Sitzb. 39 /1902/

Anacamptis pyramid. (s? u Rožnova, Rehner a Mayer) Mor. Karp. u N.
Jičína, J. Sapetza Abh. Naturf. Ges. Görlitz XII. 49
m(1865)

Anacamptis M.: horní louky u Řizna blízko Ustřina nch., F. Macháček ex
F. Petrák Illg. B. Z. XVI. 6 (70)

Anacamptis pyramidalis Rich.

Formánek. I. 1. 1887, p. 228

M.

130. Anacamptis Rich. Rudohrávek.

16648

421. A. pyramidalis Rich. (Orchis pyram. L. R. jehlanitý).
Klas hustý, mnohokvětý, z mládí krátce jehlanovitý, posléz vejčité po-
dlouhlý. Pysk do polou tříkřaný, s ústí podlouhlými, celokrajnými, na
spodíně s 2 podlouhlými šupinkami. Ostruha nitkovitá sehnutá, zdělí
semenníku. Listy úzce neb čárkovitě kopinaté, dolejší sblížené, hořejší
oddálené malé. Hlízky skoro kulovité.

V. 0.30—0.50 m. Okvětí malé, pěkně karmínové červené, řídceji
světle nachové neb bílé. Květy vonné.

4 Červen, červenec. Horní lesní, jmenovitě vápenitá luka. Pořídka.
Zřídka po hřebeni Javořiny; na horských lukách „Nová hora“ blízko morav.

hranice u Březové pod Lopeníkem (Holuby in lit.), luka lesní „nade Mžíky“
u Vesetina 1884 hojný (Bubela), u Rožnova (Schlosser). Ve Slezsku jen v Tě-
šínsku: hojný na Tulu u Horn. Lišné (Grabowski a Kotschy), blízce Ustroně
(Milde), ojedinělý na levém břehu Gluchové u Bystrzyce (Ascherson).

p. 228