

- Asplenium adiantum-nigrum L. Spec. Pl. 1081 (1753), C. Christ. Ind. Fil. 99
(1905) exl. var., Podp. Kvit. chor. I. 75 (1924). 66 (1799)
- A. nigrum Linn. Fl. Frang. I. 28 (1778), Bumbarci in Schrad. Journ. I. 313
- Phyllitis lanceifolia Mönch Meth. Suppl. 316 (1802).
- Tarachia Adiantum nigrum Reich Zinnel. Bot. 82 (1843). (1856).
- A. Adiantum nigrum ^{B^x} ~~subsp.~~ nigrum Heuffl. in Vel. bot.-Bot. Ges. Wien V. 340
tab. 313
- " " " a) genusium Celak. Prodr. 7 (1868).
- " " " a) lanceifolium Obovy F. v. Mähren 70 ().
- " " " subsp. B. Adiantum nigrum Asch. & Patr. Syn. I. 72 (1896).

Asplen. incisum O. Anth. Herb. Mo. 377, Tausch, 1825
ex Opiz Naturalientausch Nro 11 p. 338 (1826)

Asplen. Adiantum nigrum L.; Opiz in Kratos II. 14. 16 (1820), Böhl. Gew.
117 (1823), Syn. 170 (1852) part. l'atol. tenu. an. k. A. curvifolium
Tal. Ott v. Kotz II. 66 (1882) rite, v. Asplen. Ad. nigr. Konrad (u. a. L.)
z. Cl. Lisa je A. incisum Opiz

Asplen. adiant. nigr.: u. Mathidi 1596 p. 446 jako Dyopteris, u. Hernberg
Comm. Math. 8 (1821)

Asplen. adiant. nigrum
part. m. h. Atoupe v. Misch do 1700-2000 (Bermia Thun), J. Mur
DBM. X. II. 130 (II)

Asplenium Adiantum nigrum L. Steud. Nomend. Bot. Pl. Crypt. 65 (1824)
cum syn.: A. lanceolatum Hoffm. - A. nigrum Burm. - Phyllitis
lanceifolia Moench a. part. B. A. Adiantum lanceolatum Huds.

Asplen. Adiantum nigrum L., Basing. En. St. J. IV. 41 (1846), Linn.
En. Fl. Tr. 611 (1865) cum syn.:

Adiantum Reich Bot. St. J. IV. 41 (1846), Linn. En. Fl. Tr. 611 (1865) cum syn.: