

C<sup>v</sup>

Valerianella carinata Lois. Feld bei Weisswasser (Hi)!

Hippelli

Čelak.Prodr.II./1873/,p.269.

† 2. V. carinata Loisel. K. kýlnatý. Plod *podlouhle 4boký, na střední straně člunkovitě vyduťtý*; zadní strana trochu vypouklá a jemnou rýhou opatřená jest oddělena vyniklým žebrem a rýhou od ploch postranních; *vnější stěna zadního plodného pouzdra neztlustlá*; prázdná pouzdra velká, největší díl plodu čínící, tenkou přehrádkou rozdělená.

⊙ Duben, květen. Na pokrajích polních, trávnatých mezích a oubočích, velmi pořidku, aspoň z části následkem dřevnějšího vysetí jenom zdomácněly, tak zřejmě u Prahy: v horejší části nynější společenské zahrady na mezích tarasů, jindy dost hojný, nyní, jak se zdá, již poskrovnu! meze polní za Smichovem (1828 Knaf)! Sv. Ivan (Pfund). — U Liberce (Siegmund); zde snad vskutku domácí, alespoň roste na polích podél Sudet v saské Lužici i v Slézsku dle Uechtritze vskutku divoce, tak u Friedlandu slézského blízko hranic českých.

Čelak.Prodr.IV./1883/,p.802.

2. Valerianella Hall.

V. carinata Lois. — Pole u Bělé (Hipp.)! Mohla by v okolí Liberce býti samorostlá, poněvadž i v saské horní Lužici a v Slézsku podle Sudetského pásma na rolích roste (Uechtriz).

Čel.Anal.Kv.3.vyd.214, 1897.

† V. carinata Lois. Plod podlouhle 4-boký, na přední straně člunkovitě vyduťtý; vnější stěna zadního plodného pouzdra neztlustlá; prázdná pouzdra velmi velká. Ostatně jak před. ⊙ (K. kýlnatý). 4, 5. Jak předešlý; C. u Prahy, Liberce, nejspíš jen zdivočelý. Me.

*Valeriana carinata* (a. ob.) Javory /Ohren/u Podmokel, Rud.Dörre in litt.

9.VI.1904.

*Valerianella carinata* přehon' Holkové: Kynast (uvádějí též obecně *V. oblonga* a *V. savii* Monzoni), Fr. Schustler Ark. 133 (18)

*Fedra carinata* panství Lemberk a Něm. Jablonné, W. Hamburger Läm. u. Gabel 34 (1837)

C<sup>v</sup>