

GA Bromus arvensis - Horní Povltaví nad Frymburkem, SKALICKÝ 1953, Ochr. přír. Praha 8: 133. c

HR Bromus arvensis L. var. caerulescens (A. Gr.) Don. - Soběslavsko: Věrebi (4 km od) na nedo-
pau trati (J. Lukal). Pravděpodobně je vzrů. Č. proužek kardinál. Uvádí se od Pěchova
netolic. - B. J. Hroněk. Slučko květině? pr. int. v. ch. u. n. d. e. c. k. / se z. v. l. d. e. m. ...! F. S. S. a. c. a.
Přír. Praha 1952: 349.

HR Bromus arvensis L. - porostem na pustých, kamen. stránkách, hlavně
na kypčejších místech, na Uhlavské Kame, Růžohorská, na Eger B. (Růžohorská)-
- B. J. Hroněk. Fytoprogr. na strán. hr. P. ov. n. r. hr. ! F. S. S. a. c. a. Přír. Pra-
ha 1952: 217.

Bromus arvensis L.
Na stránkách/kulmské slepence-300-400m n.m./ u Vnitřních Šumic pod J. o-
krajem Dražanské vrchoviny.-F. Kühn: Bosud neznámá lokalita kavylu sliš-
ného. OP Praha 1967, 2:29.

Bromus arvensis L.

Horní Poutaví: vymizelá lokalit. čištěním osiva na Sušicku z r. 1969.
Památky a příroda 6: 605, 10/1981 (J. Vaněček)